
# MR TRI-STAR BOOKER-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000135920813**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US135920813**<br>NUMER | **2004-10-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **596** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **15** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **756** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **714** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1080** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **980** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1060** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **477** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.9** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **85** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **64** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **72** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **67** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 82 | 77 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 82 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.52 | 82 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **130** | niski | > | wysoki | 0.83 | 82 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | > | głęboki | 0.66 | 82 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.66 | 82 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 82 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.78 | 82 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 82 | 77 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 82 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 82 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.71 | 82 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.54 | 82 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **129** | słabe | > | mocne | 0.66 | 82 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.82 | 82 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 82 | 77 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.75 | 82 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 82 | 77 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 82 | 77 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.70 | 82 | 77 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.46 | 82 | 77 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.41 | 88 | 84 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.33 | 88 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.46 | 306 | 248 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.51 | 72 | 68 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.38 | 306 | 248 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 65 | < | | | 0.55 | 72 | 68 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |