
| MACEDON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000136742458** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **US136742458** NUMER | **2005-09-02** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **638** | 0.88 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-115** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.87 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **857** | 0.83 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1069** | 0.81 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1093** | 0.80 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-374** | 0.92 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **531** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **-0.32** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.2** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **-0.32** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **30.5** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **410** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **305** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.83 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.92 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **112** | mały | | | | duży | 0.80 | 68 | 52 |
| siła mleczności | F | **110** | niepożądany | | | | pożądany | 0.82 | 68 | 52 |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | | | pożądane | 0.75 | 269 | 184 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | | | pożądane | 0.81 | 269 | 184 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | | | pożądana | 0.83 | 269 | 184 |
| wysokość w krzyżu | F | **116** | niski | | | | wysoki | 0.89 | 68 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | | | głęboki | 0.89 | 269 | 184 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **87** | wąska | | | | szeroka | 0.82 | 68 | 52 |
| ustawienie zadu | F | **109** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.88 | 68 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **126** | wąski | | | > | szeroki | 0.91 | 269 | 184 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | | | podsiebna | 0.85 | 269 | 184 |
| racice | MACE | **98** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.71 | 269 | 184 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | | | równolegle | 0.78 | 269 | 184 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | | | mocne | 0.87 | 269 | 184 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **106** | niskie | | | | wysokie | 0.81 | 68 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **123** | słabe | | | > | mocne | 0.84 | 269 | 184 |
| położenie wymienia | F | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | 68 | 52 |
| szerokość wymienia | F | **102** | wąskie | | | | szerokie | 0.79 | 68 | 52 |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | | | wąskie | 0.91 | 269 | 184 |
| długość strzyków | F | **106** | krótkie | | | | długie | 0.88 | 68 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.91 | 269 | 184 |
| charakter mleczny | F | **114** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.86 | 68 | 52 |
| kondycja | F | **87** | słaba | | | | mocna | 0.87 | 68 | 52 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | | | dobra | 0.68 | 224 | 146 |
| struktura kostna | F | **103** | gruba | | | | płaska | 0.81 | 68 | 52 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **127** | | | | | > | 0.86 | 168 | 104 |
| temperament | F | **104** | | | | | | 0.70 | 77 | 57 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **100** | | | | | | 0.74 | 32 | 21 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **98** | | | | | | 0.64 | 71 | 60 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **94** | | | | | | 0.74 | 69 | 43 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **101** | | | | 0.83 | 132 | 104 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **86** | | | | 0.23 | 1 | 1 |