
# MICHIGAN SHOTTL BRAM 467-ET
NAZWA

| USAM000137300352 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US137300352** | **2006-01-31** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **6** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1054** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | - | - |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **30** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.11** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | - | - | |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | - | - | |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | - | - | |
| wymię | - | - | niepożądane | | pożądane | - | - | |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | - | - | |
| wysokość w krzyżu | - | - | niski | | wysoki | - | - | |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | - | - | |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | - | - | |
| ustawienie zadu | - | - | uniesiony | | spadzisty | - | - | |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | - | - | |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | - | - | pionowa | | podsiebna | - | - | |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | - | - | |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | - | - | |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | - | - | |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | - | - | |
| więzadło środkowe wymienia | - | - | słabe | | mocne | - | - | |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | - | - | |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | - | - | |
| ustawienie strzyków | - | - | szerokie | | wąskie | - | - | |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | - | - | |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | - | - | |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | - | - | |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | - | - | |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | - | - | |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | - | - | |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.43 | 172 | 69 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **108** | | | | 0.44 | 66 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.38 | 155 | 61 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.47 | 63 | 27 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |