
# HORSTYLE CAMBIST-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000138669492**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US138669492**<br>NUMER | **2007-05-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **691** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **28** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **975** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **870** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1083** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1028** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-188** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **435** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 110 | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 72 | 42 |
| wymię | MACE | 98 | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 72 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | 103 | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 72 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 101 | niski | | wysoki | 0.80 | 72 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | 104 | płytki | | głęboki | 0.65 | 72 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 103 | wąska | | szeroka | 0.70 | 72 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | 105 | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 72 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | 87 | wąski | | szeroki | 0.68 | 72 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 88 | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 72 | 42 |
| racice | MACE | 108 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 72 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 114 | iksowate | | równolegle | 0.54 | 72 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 96 | luźne | | mocne | 0.66 | 72 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 114 | niskie | | wysokie | 0.64 | 72 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 103 | słabe | | mocne | 0.55 | 72 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | 96 | niskie | | wysokie | 0.78 | 72 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 93 | szerokie | | wąskie | 0.74 | 72 | 42 |
| długość strzyków | MACE | 111 | krótkie | | długie | 0.78 | 72 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 100 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 72 | 42 |
| charakter mleczny | MACE | 96 | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 72 | 42 |
| kondycja | MACE | 96 | słaba | | mocna | 0.59 | 72 | 42 |
| lokomocja | MACE | 106 | słaba | | dobra | 0.50 | 72 | 42 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 96 | | | | 0.39 | 177 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 99 | | | | 0.42 | 79 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 95 | | | | 0.34 | 157 | 52 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.46 | 66 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |