
# ERNEST-ANTHONY JONAH-RED-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000138885100**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **US138885100**<br>NUMER | **2007-08-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **714** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-195** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1104** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1184** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1095** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **952** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-417** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-561** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.3** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.6** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **637** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **389** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **130** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **116** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **127** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 268 | 166 |
| wymię | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 268 | 166 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 266 | 164 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.88 | 268 | 166 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.77 | 268 | 166 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **73** | wąska | | szeroka | 0.80 | 268 | 166 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 268 | 166 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.84 | 268 | 166 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 268 | 166 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.71 | 268 | 166 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **120** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 268 | 166 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **113** | luźne | | mocne | 0.77 | 268 | 166 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.69 | 268 | 166 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.74 | 268 | 166 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.88 | 268 | 166 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 268 | 166 |
| długość strzyków | MACE | **77** | krótkie | | długie | 0.86 | 268 | 166 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 268 | 166 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 268 | 166 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.77 | 268 | 166 |
| lokomocja | MACE | **114** | słaba | | dobra | 0.55 | 268 | 166 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.33 | 168 | 83 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.15 | 169 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.44 | 1053 | 416 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | 0.57 | 545 | 259 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.38 | 1006 | 405 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.65 | 524 | 249 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |