
# HURTGENLEA JAMAR-ET

NAZWA

| USAM000139678549 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US139678549** | **2009-01-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **766** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **29** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1055** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1071** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1157** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1062** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **774** | 0.77 |

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-247** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.7** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.9** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **2096** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **661** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.58 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **127** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 302 | 130 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 302 | 130 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 297 | 128 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **122** | niski | | wysoki | 0.88 | 302 | 130 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.78 | 302 | 130 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.81 | 302 | 130 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 302 | 130 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.81 | 302 | 130 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 302 | 130 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.74 | 302 | 130 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **119** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 302 | 130 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.78 | 302 | 130 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.75 | 302 | 130 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.70 | 302 | 130 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.88 | 302 | 130 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 302 | 130 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.90 | 302 | 130 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 302 | 130 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 258 | 113 |
| kondycja | MACE | **98** | słaba | | mocna | 0.67 | 258 | 113 |
| lokomocja | MACE | **122** | słaba | | dobra | 0.59 | 302 | 130 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.51 | 2421 | 275 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.67 | 1367 | 397 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.54 | 2296 | 265 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 115 | | | | 0.69 | 1272 | 347 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |